

Tripletherapie mit Telaprevir

Name des Patienten: _____

Geburtsdatum: _____ Patientennummer: _____

Genotyp: _____ Frühere Therapie: _____

Fibrosestadium: _____ Resistenzmutationen: _____

Woche	Therapiebeginn	1	2	3	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	SVR12
Datum																	
Pegyliertes Interferon Dosierung (µg)					ABBRUCH wenn HCV-RNA >1000 IU/ml		ABBRUCH wenn HCV-RNA >1000 IU/ml			ABBRUCH wenn HCV-RNA positiv, ENDE wenn HCV-RNA negativ W 4 und 12 bei naïv/Relapse ohne Zirrhose						ENDE	
Ribavirin Dosierung (mg)					ABBRUCH wenn HCV-RNA >1000 IU/ml		ABBRUCH wenn HCV-RNA >1000 IU/ml			ABBRUCH wenn HCV-RNA positiv, ENDE wenn naïv, Relaps, HCV-RNA negativ W4 und 12						ENDE	
Telaprevir Dosierung (mg)					ABBRUCH wenn HCV-RNA >1000 IU/ml		ENDE										
Komedikation																	
Komedikation																	
Komedikation																	
Labor		1	2	3	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
HCV-RNA IU/ml (Viruslast)																	
Hämoglobin																	
Neutrophile																	
Thrombozyten																	
GPT																	
TSH																	
Nebenwirkungen																	